

« Une citation de nichée dans les environs de Neuchâtel me paraît devoir être plutôt exceptionnelle, bien qu'on ait rencontré aussi quelquefois cet oiseau sur le Léman, soit encore au commencement de mai, soit déjà vers la fin de juillet ou en août. Il passe d'ordinaire en mars et avril, ainsi que dès la fin de septembre et en octobre ou novembre; et l'on voit, au printemps, bien plus de jeunes que d'adultes en livrée. »

Dass diese Art bei uns sonst nur Wintergast ist, beweisen nachfolgende Beiträge und Beobachtungen von Mitarbeitern. Wir richten gleichzeitig an unsere Beobachter die Bitte um Zustellung weiterer Feststellungen über den Schwarzhalstaucher.

Schwarzhalstaucher. *Podiceps n. nigricollis* Brehm.

Beobachtungen bei Zürich.

1923. 2. XII. 23. 3 Stück in der Nähe der Badanstalt Utoquai.
4. XII. Abends 16 Uhr 30 von der Quaibrücke aus 3 Stück gesehen.
30. XII. Bei der Quaibrücke 5 Stück gesehen.

1924. 5. I. 24. 3 Stück gegen die Quaibrücke zu. 7. I. Mittags 13 Uhr 30 1 Stück bei der Quaibrücke. 12. I. 3 Stück bei der Badanstalt (Männerabteilung) Enge. 26. I. Morgens 8 Uhr 30 3 Stück gegen die Quaibrücke zu. 12. III. 1 ♂ im Prachtskleid bei der Männerbadanstalt in der Enge. (Iris rot. Fächerartiger Ohrenschmuck.)

1925. 24. I. 25. 4 Stück auf dem See beim Strandbad. 15. II. Morgens 7 Uhr 30 2 Stück in der Nähe des Dampfschiffsteges Bahnhofstrasse.

1926. ?

1927. 1. I. 27. 2 Stück beim Dampfschiffsteg Theater. 2. I. 2 Stück beim Dampfschiffsteg Theater. (Dunkle Haube bis unter die Augen reichend. Helle Wangenflecken auf dem Rücken des Halses sich nicht treffend. Schnabel schlank, leicht aufwärtsgerichtet an der Spitze.)
19. I. 2 Stück weit draussen, Dampfschiffsteg Seefeldquai. 22. u. 23. I. 3 Stück beim Dampfschiffsteg Seefeldquai. 2. II. 5 Stück bei der Badanstalt Utoquai. 5. II. 2 Stück bei der Badanstalt Utoquai. 11. II. 3 Stück bei der Badanstalt Utoquai.

1928. 4. I. 28. 1 Stück beim Strandbad. 8. I. 1 Stück beim Strandbad, 1 Stück bei der Badanstalt Utoquai.

1928 und 1929 war ich krank Ende Winter und im Vorfrühling!

Julie Schinz.

Vom Schwarzhalstaucher auf dem Sempachersee.

Seit 30 Jahren beobachte ich diesen Vogel regelmässig auf unserm See auf dem Zuge und als Wintergast. Kommt er im Frühlingskleide, so ist er gut zu bestimmen, mehr Schwierigkeiten macht er dem Beobachter im Winterkleide, in welchem er leicht mit dem Hornsteissfuss verwechselt werden kann. Das sicherste Zeichen ist der Schnabel, dessen First beim Schwarzhals gerade ist oder gar einen flachen Sattel bildet, während die First beim Hornsteissfuss einen Bogen nach abwärts macht. Da muss man denn oft lange mit dem Feldstecher Ausschau nach dem Gaste halten, bis er einmal sein Profil zeigt und wir dabei die Form des Schnabels sicher sehen können. Allerdings ist unser Vogel meist etwas kleiner. Seine Masse ändern stark ab. Hier und da sieht man solche, die kaum grösser sind als ein Zwergtaucher, andere